

大腸がん

レジメン名称	薬品名		1日投与量	投与時間	投与日(day)	1コース期間	備考
XELOX	Cap	ゼローダ	1000 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~14	3週毎	アプレピタント(±)
	L-OHP	エルプラット	130 mg/m ²	120 分	1		
XELOX+B-mab	B-mab	アバスチン	7.5 mg/m ²	90 分(初回)	1	3週毎	アバスチン2回目60分 3回目30分 アプレピタント(±)
	Cap	ゼローダ	1000 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~14		
	L-OHP	エルプラット	130 mg/m ²	120 分	1		
FOLFIRI	ℓ-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	CPT-11	イリノテカン	120 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
FOLFIRI+AFL	AFL	ザルトラップ	4 mg/kg	60 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	ℓ-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	CPT-11	イリノテカン	120 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
FOLFIRI+B-mab	B-mab	アバスチン	5 mg/kg	90 分(初回)	1	2週毎	アバスチン2回目60分 3回目30分 アプレピタント(±)
	ℓ-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	CPT-11	イリノテカン	120 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
FOLFIRI+P-mab	P-mab	ベクティビックス	6 mg/kg	60 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	ℓ-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	CPT-11	イリノテカン	120 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
FOLFIRI+RAM	RAM	サイラムザ	8 mg/kg	60 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	ℓ-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	CPT-11	イリノテカン	120 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
XELIRI(150/m ²)	Cap	ゼローダ	800 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~14	3週毎	アプレピタント(±)
	CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	90 分	1		
XELIRI(200/m ²)	Cap	ゼローダ	800 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~14	3週毎	アプレピタント(±)
	CPT-11	イリノテカン	200 mg/m ²	90 分	1		
XELIRI(150/m ²)+ B-mab	B-mab	アバスチン	7.5 mg/kg	90 分	1	3週毎	アバスチン2回目60分 3回目30分 アプレピタント(±)
	Cap	ゼローダ	800 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~14		
	CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	90 分	1		

XELIRI(200/m ²)+ B-mab	B-mab	アバスチン	7.5 mg/kg	90 分	1	3週毎	アバスチン2回目60分 3回目30分 アプレピタント(±)
	Cap	ゼローダ	800 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~14		
	CPT-11	イリノテカン	200 mg/m ²	90 分	1		
mFOLFOX6	Q-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1	2週毎	
	L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
mFOLFOX6 + B-mab	B-mab	アバスチン	5 mg/kg	90 分	1	2週毎	アバスチン2回目60分 3回目30分 アプレピタント(±)
	Q-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
mFOLFOX6 + P-mab	P-mab	ベクティビックス	6 mg/kg	60 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	Q-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
mFOLFOX6 + CET	Cetuximab	アービタックス	500 mg/m ²	120 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	Q-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
FOLFIRI + CET	Cetuximab	アービタックス	500 mg/m ²	120 分	1	2週毎	アプレピタント(±)
	Q-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	400 mg/m ²	15 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	46 時間	1~3		
FOLFOXIRI + B-mab	B-mab	アバスチン	5 mg/kg	90 分(初回)	1	2週毎	アバスチン2回目60分 3回目30分 アプレピタント(+)
	Q-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	120 分	1		
	CPT-11	イリノテカン	165 mg/m ²	60 分	1		
	L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	120 分	1		
	5-FU	フルオロウラシル	3200 mg/m ²	46 時間	1~3		
TAS102 ± B-mab	B-mab	アバスチン	5 mg/kg	90 分	1,15	TAS102 4週 毎	アバスチン2回目60分 3回目30分
	TAS102	ロンサーフ	35 mg/m ² /回	内服 1日2回	1~5/8~12		
Cetuximab + Encorafenib +Binimetinib 【隔週投与】	Cetuximab	アービタックス	500 mg/m ²	120 分	1	2週毎	
	Encorafenib	ビラフトビ	300 mg/回	内服 1日1回	連日投与		
	Binimetinib	メクトビ	45 mg/回	内服 1日2回	連日投与		
Cetuximab + Encorafenib 【隔週投与】	Cetuximab	アービタックス	500 mg/m ²	120 分	1	2週毎	
	Encorafenib	ビラフトビ	300 mg/回	内服 1日1回	連日投与		

Cetuximab + Encorafenib +Binimetinib	Cetuximab	アービタックス	400 mg/m ²	120 分	1	1週毎	アービタックス2回目以降 250mg/m ² (60分)
	Encorafenib	ビラフトビ	300 mg/回	内服 1日1回	連日投与		
	Binimetinib	メクトビ	45 mg/回	内服 1日2回	連日投与		
Cetuximab + Encorafenib	Cetuximab	アービタックス	400 mg/m ²	120 分	1	1週毎	アービタックス2回目以降 250mg/m ² (60分)
	Encorafenib	ビラフトビ	300 mg/回	内服 1日1回	連日投与		